

Indikační kritéria

1. Novorozenci narození v gestačním týdnu ≤ 28 , u kterých byla diagnostikována BPD. Pro tyto pacienty platí věkový limit 1 rok nebo 12 měsíců od propuštění z perinatologického centra.
2. Novorozenci narození v gestačním týdnu ≤ 28 bez BPD nebo novorozenci s porodní hmotností ≤ 1000 g a narození do 6 měsíců před začátkem nebo propuštění v průběhu RSV sezóny.
3. Novorozenci narození v gestačním věku $29 + 0$ až $31 + 6$, bez BPD, s porodní hmotností ≤ 1500 g, narození maximálně 6 měsíců před začátkem RSV sezóny nebo propuštění v průběhu RSV sezóny.
4. Novorozenci s BPD, bez ohledu na gestační týden, kteří vyžadovali léčbu chronického plicního onemocnění (oxygenoterapii, bronchodilatační terapii, kortikoidy, diuretika) ještě 6 měsíců před začátkem RSV sezóny. Tito novorozenci mohou dostat léčivý přípravek jako imunoprofylaxi do 2 let věku (možnost aplikovat profylaxi i 2 sezóny).
5. Hospitalizovaní nezralí novorozenci, ohrožení nozokomiální RSV infekcí, mohou dostat 1 dávku Synagisu.